

Схема применения при коррекции дефицита или недостаточности витамина D

Суммарная нагрузочная доза
(соответствует рекомендациям
Российского общества эндокринологов)²

ФортеДетрим³

Капсул

Коррекция дефицита витамина D

Показатель 25(OH)D
< 20 нг/мл

400 000 –
448 000 МЕ



8 недель

4 000 МЕ

10 000 МЕ



2 в день



5 в неделю

Коррекция недостаточности витамина D

Показатель 25(OH)D
≥ 20 и < 30 нг/мл

200 000 –
224 000 МЕ



4 недели

4 000 МЕ

10 000 МЕ



2 в день



5 в неделю

Поддержание уровня витамина D

Показатель 25(OH)D
≥ 30 нг/мл

10 000 МЕ
в неделю



Длительно

10 000 МЕ



1 в неделю

*Суммарные насыщающие дозы согласно рекомендациям РАЭ: Коррекция дефицита 400 000-448 000 МЕ = 2 капсулы 4000 МЕ в день или 5 капсул 10 000 МЕ в неделю 8 недель. Коррекция недостаточности 200 000-224 000 МЕ = 2 капсулы 4000 МЕ в день или 5 капсул 10 000 МЕ в неделю 4 недели.

1. Лекарственный препарат витамина D в дозировке выше 500 МЕ в таблетке/капсуле/капле по данным сайта <https://grls.rosminzdrav.ru/> на 07.10.2020. 2. Клинические рекомендации РАЭ 2016. Дефицит витамина D у взрослых – при сравнении с количеством таблеток/капсул продуктов витамина D с более низкой дозировкой в таблетке (менее 2 000 МЕ). 3. Инструкция по медицинскому применению Фортедетрим ЛП-006050. 4. GMP-01082/19/PL 28.03.2019

Информация для медицинских и фармацевтических работников.
АО «АКРИХИН», 142450, Московская область, Ногинский район, Старая Купавна, улица Кирова, дом 29. Тел.: +7 (495) 702-95-06, факс: +7 (495) 702-95-03, e-mail: info@akrikhin.ru

Узнайте больше о Фортедетриме
на www.Akrikhin.org/ForteDetrim

 **акрихин**
Люди заботятся о Людах